


Памятка о проведении вакцинации против COVID-19



**Информация в рельефно-точечном,
крупношрифтовом и аудиоформатах**

**Новосибирск
2021**

Памятка

о проведении вакцинации против COVID-19

1 Перед проведением вакцинации предлагаем ознакомиться

с основными правилами.

Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19.

2 Противопоказаниями к вакцинации являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.

3 Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр у врача

с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации (уровня насыщения крови кислородом), осмотром зева, на основании которых врач-специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.

Врач расскажет вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.

4 Вакцинацию проводят в два этапа:

вначале вводят внутримышечно компонент I. На 21 день вводят внутримышечно компонент II.

5 В течение 30 мин после вакцинации необходимо оставаться в медицинской организации для наблюдения и предупреждения возможных аллергических реакций.

6 В течение трех последующих дней

после проведения вакцинации могут развиваться общие симптомы: озноб, повышение температуры тела, боли в суставах, в мышцах, общее недомогание, головная боль; а также местные реакции: болезненность в месте инъекции, покраснение, отёчность.

Реже отмечаются тошнота, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

- 7** **Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации** не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отёчности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации – нестероидные противовоспалительные средства.

- 8** **Вакцина против COVID-19 не отменяет** для привитого человека необходимости носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Отпечатано в отделе реформатирования
и специальной полиграфии
Новосибирской областной специальной библиотеки
для незрячих и слабовидящих.
630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 15



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОСДРАВНАЗЗОРА
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ
